


Neutralice una sobredosis de opiáceos con naloxona

1

EXAMINE

Examine la respiración de la persona e intente despertarla.



2


LLAME

Llame al 911.

3

AYUDE A RESPIRAR

Provea asistencia respiratoria con compresiones de pecho (con o sin respiración boca a boca).



4

APLIQUE

Si no responde, aplique naloxona.

Consulte el anverso para obtener instrucciones detalladas sobre la aplicación de cada tipo de naloxona.

5


QUÉDESE

Siga haciendo compresiones de pecho hasta que la persona consiga respirar por su cuenta. Coloque a la persona de costado y quédese hasta que llegue ayuda.





Descargue herramientas de capacitación y obtenga más información en **ReverseOverdose.org**

INSTRUCCIONES DE AEROSOL NASAL





1. Sostenga el dispositivo con el pulgar sobre el extremo inferior del émbolo y dos dedos alrededor de la boquilla.*

INSTRUCCIONES DE AEROSOL INTRANASAL



1. Quite los tapones superior e inferior de la jeringa.


2. Enrosque el cono blanco sobre la parte superior de la jeringa.



3. Retire la tapa de la cápsula de la naloxona.

4. Enrosque la cápsula de naloxona en el tubo de la jeringa.

5. Coloque el cono blanco en el orificio nasal. Empuje brevemente el extremo de la cápsula de naloxona. La mitad del contenido de la cápsula ingresará en la nariz.*



*Puede aplicar dosis adicionales cada 2 o 3 minutos hasta que la persona responda.