


# Đảo ngược Tình trạng Quá liều Opioid với Naloxone

1

## KIỂM TRA

Kiểm tra hơi thở và cố gắng đánh thức người đó dậy.



2

## GỌI ĐIỆN


Gọi 911.



3

## THỞ

Hỗ trợ người đó thở bằng cách ép ngực (có hoặc không hô hấp nhân tạo)



4

## XỊT

Nếu không có phản ứng, hãy sử dụng naloxone. **Xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau với từng loại thuốc naloxone.**

5


## Ở LẠI

Tiếp tục ép ngực cho đến khi người đó tự thở được. Đặt người đó nằm nghiêng và ở lại cho tới khi người trợ giúp tới.





Tải xuống Công cụ Tập huấn và tìm hiểu thêm tại **ReverseOverdose.org**

## HƯỚNG DẪN XỊT MŨI





1. Giữ thiết bị với ngón tay cái ở dưới đáy ống thuốc và hai ngón tay ở hai bên vòi xịt.\*

## HƯỚNG DẪN XỊT SÂU TRONG MŨI



1. Kéo hoặc cạy cả nắp trên và dưới ống tiêm ra.


2. Vít đầu hình nón trắng lên đỉnh ống tiêm.



3. Cạy nắp của viên naloxone.

4. Vít ống thuốc naloxone vào trong lòng ống tiêm.

5. Đặt hình nón trắng vào lỗ mũi. Đẩy nhẹ vào phần cuối của ống thuốc naloxone. Một nửa ống thuốc cho mỗi bên lỗ mũi.\*



\*Có thể dùng liều bổ sung cứ sau 2–3 phút cho đến khi người đó có phản ứng.